

## Michel DESFAYES. — Les oiseaux des marais de Grône (Valais)

Les marais de Grône sont une dernière relique de la vaste plaine marécageuse qui occupait autrefois le fond de la vallée du Rhône. On y voit encore ces grandes flaques d'eau au fond vaseux d'où émergent de grosses touffes de *Carex*, paradis des Râles et des Foulques, ces roseaux denses où se faufilent les Rousserolles.

C'est à Robert Heinaud, naturaliste genevois, que nous devons la « découverte » de ces marais. Il a su y retrouver, plus modeste il est vrai, la vie riche et palpitante des marais d'antan. Il a publié dans ce bulletin une intéressante étude sur les oiseaux de cette région. Comme il disait, on n'y voit rien qui ne se retrouve ailleurs. Toutefois, nous avons observé des espèces qui ne trouvent nulle part dans notre canton un biotope favorable à leur reproduction, en particulier le Héron blongios.

Les naturalistes ne sont pas les seuls à avoir découvert ces marais : les chasseurs les ont même précédés, et les « gouilles » à Canards leur sont familières autant que les vernes où chantent les Faisans. Ils ont compris leur intérêt en les déclarant cette année « réserve de chasse ». Nul doute que le gibier y trouvant des abris très favorables ne rayonne aux alentours. Nous souhaitons tous que cette région soit préservée d'un assainissement fatal et... onéreux. L'ordonnance du Conseil d'Etat du 5 octobre 1948 assure cette protection, nous en sommes très heureux.

Le caractère le plus intéressant de ces marais est leur proximité du coteau qui, bien que mal ensoleillé, présente des aspects de versants mieux exposés. On y trouve, en effet, de nombreux Engoulvents et Bruants fous. Cette pente sèche, baignant son pied dans les marécages, offre donc un contraste bien étonnant. N'y voit-on pas des Bruants fous, amis des broussailles et des rochers arides, se percher sur des roseaux, tandis que leur congénère le Bruant des roseaux volète anxieusement d'un échalas à l'autre ?

S'il manque des espèces rarissimes, les autres y sont bien représentées et nous pouvons dire que ces marais sont très riches en oiseaux. Nous avons dénombré quelque 90 espèces, auxquelles il faudrait ajouter quelques migrateurs passant fréquemment en plaine : Etourneaux, Phragmites, Pipits farlouses, etc., et probablement aussi des Limnicoles (j'en ai vu un sans pouvoir le déterminer). Une telle étude est loin d'être complète, car ce n'est pas en faisant quelques rares sondages

que l'on peut étudier une avifaune régionale. Néanmoins les notes suivantes permettront de s'en faire une idée.

Grèbe castagneux, *Podiceps rufficollis*. — Présent à toute saison. Nicheur et hôte d'hiver, ceux-ci s'établissant sur le ruisseau qui serpente à travers le marais ; deux ou trois couples. Héron cendré, *Ardea cinerea*. — De passage : un le 5 octobre 1947, un le 6 mai 1948. Héron blongios, *Ixobrychus minutus*. — Nicheur probable. H a i n a r d l'a observé le 13 juin 1933. J'ai entendu son chant les 12 et 13 juin 1948. C'est aujourd'hui le seul endroit en Valais où ce joli petit Héron de la taille du Pigeon puisse nicher. Canard colvert, *Anas platyrhynchos*. — De passage et hôte d'hiver. Quelques chasseurs croient qu'il niche, mais on n'en a aucune preuve. Et pourtant le milieu semble lui être favorable. Autrefois répandue, cette espèce n'est plus aujourd'hui, en Valais qu'un nicheur rare. J'ai constaté sa dernière nichée à Sailon, en 1947. Sarcelle d'été, *Anas querquedula*. — De passage. Observée par H e i n a r d en mars 1934. Sarcelle d'hiver, *Anas crecca*. — De passage, un mâle le 23 mars 1934 (H a i n a r d). Canard pilet, *Anas acuta*. — De passage, observé par H a i n a r d le 23 mars 1934.

Buse bondrée, *Pernis apivorus*. — Vue par H a i n a r d, 13-14 juin 1933. Autour, *Accipiter gentilis*. — Un jeune le 23 mars 1934 (H a i n a r d). Epervier, *Accipiter nisus*. — Nicheur dans le coteau, en chasse dans les marais. Buse variable, *Buteo buteo*. — Vue le 23 mars 1934 (H a i n a r d) et le 21 mars 1948. Crécerelle, *Falco tinunculus*. — Vu le 23 mars 1934 (H a i n a r d) et le 21 mars 1948.

*Remarques* : Ces rapaces ne nichent pas dans les marais mais viennent y chasser quelques fois.

Faisan, *Phasianus colchicus*. — Chantent dans les aulnes au bord du Rhône.

Râle d'eau, *Rallus aquaticus*. — Nicheur fréquent et probablement aussi hivernant. Râle de genêts, *Crex crex*. — Chante le 28 juin 1950 dans les prés bordant le marais, en dessous de Pramagnon.

Poule d'eau, *Gallinula chloropus*. — Nicheur et probablement sédentaire. Un nid avec 5 œufs le 14 juin 1933 (H a i n a r d) ; un nid avec 4 œufs le 13 juin 1948. Foulque noire, *Fulica atra*. — Quelques couples nicheurs. Nids vides le 13 juin 1948 et le 28 juin 1950. Emigre certainement l'hiver. Arrivée : début avril. Chevalier guignette, *Actitis hypoleucos*. — De passage au bord du Rhône 16 avril 1934 (H a i n a r d). Bécassine des marais, *Capella gallinago*. — De passage et hôte d'hiver. 26 janvier 1929 (H a i n a r d) et 13 novembre 1949.

Pigeon ramier, *Columba palumbus*. — Niche dans le coteau. De passage sur les marais. Tourterelle, *Streptopelia turtur*. — Nicheur probable. Je l'ai entendu chanter le 28 juin 1950. Son nid n'a pas encore été trouvé en Valais.

Coucou, *Cuculus canorus*. — Nicheur. Cette espèce si éclectique se rencontre beaucoup dans les marais où elle parasite fréquemment les nids de Rousserolles effarvates.

Chouette hulotte, *Strix aluco*. — Chante dans le coteau. Hibou petit-duc, *Otus scops*. — Chante dans la nuit du 5 mai 1948. Je l'entends encore le 28 juin 1950 dans les vergers en dessous de Pramagnon. Hibou moyen-duc, *Asio otus*. — Nicheur probable. Chants entendus dans les buissons et les peupliers le 28 mars et le 11 avril 1948. Le 28 mars j'ai trouvé une dépouille dans les buissons. Chouette chevêche, *Athene noctua*. — Cris de l'espèce dans les vergers de Pramagnon le 6 septembre 1950. Chants le 11 avril 1948 près du Rhône.

Engoulvent, *Caprimulgus europaeus*. — Chantent nombreux dans le coteau en mai-juin, l'un se met à chanter en plein soleil.

Martinet noir, *Apus apus*. — Chasse parfois au-dessus des marais.

Martin-pêcheur, *Alcedo atthis*. — Nicheur et hôte d'hiver. Le marais de Grône est le seul lieu connu en Valais, où niche le Martin-pêcheur, il est fréquent sur les canaux en hiver. Haïnard l'a signalé les 13 et 14 juin 1933 (probablement deux couples). Le 30 avril 1950, je découvre son nid dans une sablière au bord de la route. La profondeur du trou est de 60 cm. le 5 mai, avec précaution, je parviens à atteindre le nid depuis dessus. Il contient 2 jeunes et 4 œufs clairs. Le fond de la chambre est recouvert d'arêtes et de débris de petits poissons. Notons que les Chevaines abondent dans le marais. Après baguement, le trou est soigneusement recouvert. C'est certainement le milieu favorable à la nidification (bans de sable) qui conditionne l'expansion de cet oiseau.

Huppe, *Upupa epos*. — Chant entendu le 12 avril 1948. Un individu vu le 28 juin 1950.

Torcol, *Jynx torquilla*. — Chant entendu le 6 mai 1948. Pic épeiche, *Dendrocopos major*. — Cris le 12 avril 1948. Pic vert, *Picus viridis*. — Chant le 21 mai 1948.

Alouette lulu, *Lullula arborea*. — Nicheur dans les parties graveleuses ; jeunes et adultes le 14 juin 1933. Chants le 21 mars 1949 et

le 9 avril 1950. Alouette des champs, *Alauda arvensis*. — Nicheur dans les prés à l'est des marais.

Hirondelle de rocher, *Ptyoprogne rupestris*. — Observées par Hainard sur le Rhône, 22 mars 1934. Hirondelle de fenêtre, *Delichon urbica*. — En chasse au-dessus des marais le 28 juin 1950. Hirondelle rustique, *Hirundo rustica*. — En chasse au-dessus des marais, 12 avril 1948. Le 6 septembre 1950, à 5 h. 50, j'assiste à l'envol de plusieurs milliers d'Hirondelles qui avaient passé la nuit dans les roseaux. Elles se dirigent vers l'ouest.

Loriot, *Oriolus oriolus*. — Nicheur probable. Chante dans les grands Peupliers, 6 mai 1948, 28 juin 1950. Corneille noire, *Corvus corone*. — Niche probablement dans les peupliers au bord du Rhône. Choucas, *Coloeus monedula*. — De passage : cris le 8 décembre 1947 et le 21 mars 1948. Casse-noix, *Nucifraga caryocatactes*. — Erratique, 1 individu le 11 septembre 1949. Pie, *Pica pica*. — Nicheur fréquent. Toute l'année. Viennent en nombre passer la nuit dans les buissons. Geai, *Garrulus glandarius*. — Observé dans les buissons. Niche dans le coteau.

Mésange charbonnière, *Parus major*. — Nicheur. Toute l'année. Mésange bleue, *Parus caeruleus*. — Le 21 mars 1948, une Mésange bleue entre dans la cavité d'un peuplier. Le 8 décembre 1949, elles sont très nombreuses dans les roseaux. Mésange noire, *Parus ater*. — Erratique (21 mars 1948). Niche dans le coteau. Mésange huppée, *Parus cristatus*. — Niche dans le coteau. Mésange nonette, *Parus palustris*. — Hivernant : 23 mars 1934 (Hainard). Elle semble manquer complètement en plaine du Rhône comme nicheur. Par contre on la voit fréquemment en hiver. Mésange à longue queue, *Aegithalos caudatus*. — Fréquente en erratisme hivernal ; niche dans le coteau.

Grimpereau des jardins, *Certhia brachydactyla*. — Nid en construction dans une fente de rocher à 200 m. à l'ouest de l'embouchure du ruisseau dans le Rhône. Grimpereau familier, *Certhia familiaris*. — Dans les conifères du coteau. Cincle, *Cinclus cinclus*. — Hivernant au bord du Rhône et du ruisseau, près de son embouchure. Troglodyte, *Troglodytes troglodytes*. — Hivernant fréquent ; chante. Traquet tairier, *Saxicola rubetra*. — Nicheur, entre les marais et la route. Rossignol, *Luscinia megarhyncha*. — Chantent très nombreux, dans les buissons. Nulle part je n'ai rencontré autant de Rossignols ! Encore des cris le 6 septembre 1950. Rouge-gorge, *Erithacus rubecula*. — Nombreux hivernants ; chantent.

Grive litorne, *Turdus pilaris*. — Hivernant. Environ 150 le 21 mars 1949. Grive draine, *Turdus viscivorus*. — Niche dans le coteau ; passe parfois sur le marais. Grive musicienne, *Turdus ericetorum*. — De passage ; un individu chante le 21 mars 1949 dans les buissons. Chantent sur le coteau. Merle noir, *Turdus merula*. — Chante et niche. J'ai entendu son chant le 6 septembre 1950 à Pramagnon. Locustelle tachetée, *Locustella naevia*. — De passage. Chant le 17 avril 1934 (Hainard) et 6 mai 1948. Egalement entendus le 28 juin 1950. Nicheur ? Rousserolle turdoïde, *Acrocephalus arundinaceus*. — Nicheur ; quelques couples. Le 12 juin 1948, un nid contient un jeune mort, un autre 4 œufs. Son chant âpre et perçant, la voix même du marais, retentit parfois en pleine nuit alors que tout est silencieux. Rousserolle effarvatte, *Acrocephalus scirpaceus*. — Nicheur fréquent ; Chant le 12 avril 1948 ; cris le 6 septembre 1950. Rousserolle verderolle, *Acrocephalus palustris*. — Observée par Hainard le 14 juin 1933 ; chantent le 13 juin 1948 et 28 juin 1950. Nicheur probable. Phragmite sp. ? *Acrocephalus* sp. ? — Entendu le 6 septembre 1950, des cris de Phragmites, probablement ph. des joncs, *A. schoenobaenus*.

Fauvette des jardins, *Sylvia borina*. — Niche sans doute dans les arbres. Fauvette à tête noire, *Sylvia atricapilla*. — Niche dans les parties buissonnantes. Premier chant en 1948 : 21 mars. Fauvette grissette, *Sylvia communis*. Niche le long du Rhône et de la route. Pouillot véloce, *Phylloscopus collybita*. — Nicheur abondant. Pouillot fitis, *Phylloscopus trochilus*. — De passage ; chants les 12 avril et 6 mai 1948. Pouillot de Bonelli, *Phylloscopus bonelli*. — Niché dans le coteau. Roitelet huppé, *Regulus regulus*. — Erratique : 23 mars 1934 (Hainard), 21 mars 1948. Accenteur mouchet, *Prunella modularis*. Hivernant, 13 novembre 1949. Pipit des arbres, *Anthus trivialis*. — Nicheur, 6 mai 1948. Pipit spioncelle, *Anthus spinoletta*. — Hivernant, fréquent.

Bergeronnette printanière, *Motacilla flava*. — De passage ; a été vue par G é r o u d e t. Bergeronnette des ruisseaux, *Motacilla cinerea*. — Hivernant. Bergeronnette grise, *Motacilla alba*. — De passage, plusieurs centaines le 12 avril 1948.

Pie-grièche grise, *Lanius excubitor*. — Niche certainement sur les peupliers au bord du Rhône ; chants et poursuites les 21 mars 1949. Pie-grièche écorcheur, *Lanius collurio*. — Niche dans les fourrés au bord de la route. Jeunes à la becquée le 28 juin 1950. Moineau domestique, *Passer domesticus*. — Erratique. Moineau friquet, *Passer*

*montanus*. — Viennent nombreux passer la nuit dans les buissons (21 mars 1949). Pinson, *Fringilla coelebs*. — Nicheur, toute l'année. Chardonneret, *Carduelis carduelis*. — Observé le 21 mars 1948 et 13 novembre 1949. Tarin, *Carduelis spinus*. — Hivernant : 23 mars 1934 (Hainard) 22 janvier 1949. Linotte *Carduelis cannabina*. — 23 mars 1934 (Hainard). Cris le 12 avril 1948.

Bouvreuril, *Pyrrhula pyrrhula*. — Erratique : 28 mars 1948. Bruant jaune, *Emberiza citrinella*. — Nicheur et hivernant. Bruant ortolan, *Emberiza hortulana*. — Nicheur. Entendu son chant le 28 juin et le 6 septembre 1950, dernier chant de l'année. Dans les jardins au bord de la route. Bruant fou, *Emberiza cia*. — Niche dans le coteau et même au bord de la route. Jeunes hors du nid le 28 juin 1950. Des adultes nourrissant leurs jeunes vont chercher leur nourriture jusqu'au bord des roseaux. Quelques hivernants aiment à se tenir sur les buissons entourant les cônes de sable qui s'élèvent au milieu des roseaux. Bruant des roseaux, *Emberiza schoeniclus*. — Nicheur assez fréquent. Hivernants plus rares (13 novembre 1949, 22 janvier 1949).

Saillon, 11 novembre 1950.

### Bibliographie

R. HAINARD : « Les oiseaux du marais de Grône », *La Murithienne*, fasc. LII (1934-1935), p. 91-93.

---